



Интенсивная технология в садоводстве юга России, обеспечивающая скороплодность, высокую урожайность насаждений и качество плодов, предусматривает, с одной стороны, использование потенциальных возможностей высокопродуктивных плодовых растений, а с другой – рациональное использование природных ресурсов при оптимизации условий выращивания в конкретной почвенно-климатической зоне. При этом важно учитывать возможности потребления как возобновимых, так и не возобновимых природных ресурсов, представляющих собой совокупность средообразующих компонентов.

Возрастает актуальность ресурсосберегающих технологий с использованием крон, обеспечивающих снижение трудоёмкости работ при их формировании и уходе за ними, уменьшение затрат на уборку урожая и в перспективе – возможность механизации работ. В этой связи задача стабильного ежегодного производства плодов в слаборослых насаждениях сливы, с ориентированным уровнем рентабельности продукции, реализуема при соблюдении в кроне равномерности освещения, оказывающей влияние на продуктивность деревьев и товарные качества плодов.

Цель исследований – изучить продуктивность растений сливы в различных конструкциях насаждений на подвое алыча с плотностью посадки более 1000 шт./га.

Объектом исследований являются растения сливы на подвое алыча в насаждениях при густоте посадки 1000 шт./га и более. В процессе работы определялись биометрические показатели с применением стандартного инструментария для измерений, а также урожайность и удельная продуктивность в расчёте на площадь проекции кроны. Обрезка насаждений проведена в 2 этапа: первый этап – ранневесенняя обрезка; корректирующая летняя обрезка – второй этап.

При проведении полевых исследований использована общепринятая «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орёл, 1999).

Обсуждение результатов. На первом этапе работ анализировали затраты труда на формирование различных типов кроны деревьев сливы (табл. 1).

Таблица 1 - Затраты труда на обрезку деревьев сливы на подвое алыча

Сорт
Сила роста
Система формирования кроны
Затраты труда, чел.час./га
весенняя обрезка
летняя обрезка

Продуктивность различных конструкций насаждений сливы

Автор: Иван Евгеньевич

09.02.2011 18:09 - Обновлено 13.03.2016 06:24

всего

Стенлей, контроль

сильн.

разреженно-ярусная

19,8

16,1

35,9

Стенлей

сильн.

веретеновидная

18,6

Продуктивность различных конструкций насаждений сливы

Автор: Иван Евгеньевич

09.02.2011 18:09 - Обновлено 13.03.2016 06:24

15,0

33,6

Стенлей

сильн.

кустовидная

17,8

15,3

33,1

Стенлей

слаборосл.

кордон одноплечий

Продуктивность различных конструкций насаждений сливы

Автор: Иван Евгеньевич

09.02.2011 18:09 - Обновлено 13.03.2016 06:24

14,3

4,3

18,6

Стенлей

слаборосл.

кордон двуплечий

14,1

4,8

18,9

Чачакская улучшенная

сильн.

Продуктивность различных конструкций насаждений сливы

Автор: Иван Евгеньевич

09.02.2011 18:09 - Обновлено 13.03.2016 06:24

веретеновидная

20,1

18,2

38,3

Анжелено

сильн.

веретеновидная

24,3

22,1

46,4

Милена

Продуктивность различных конструкций насаждений сливы

Автор: Иван Евгеньевич

09.02.2011 18:09 - Обновлено 13.03.2016 06:24

СИЛЬН.

веретеновидная

22,4

21,4

43,8

Наибольшие затраты труда на обрезку деревьев – у сортов Анжелено, Милена с веретеновидной формировкой кроны (46,4-43,8 чел.час./га), что обусловлено повреждением цветковых почек в зимне-весенний период и избыточным ростом растений в текущем году (рис. 1, 2).

Продуктивность различных конструкций насаждений сливы

Автор: Иван Евгеньевич

09.02.2011 18:09 - Обновлено 13.03.2016 06:24



Вариант 1. Матрица факторов, влияющих на вегетативного роста растений сливы



Рис. 2. Формы и окраска плодов растений сорта Мелен (изображены в натуральную величину): а) удлиненно-яйцевидная (к.); б) удлиненно-яйцевидная (к.); в) веретеновидная (зелёная обрезка)

09.02.2011 18:09 - Обновлено 13.03.2016 06:24

веретеновидная (зелёная обрезка)
двудольная двудольный



Рис. 14. Копирование части тела животного под бокс (2008) с дугой хитомостью



$\frac{0.98}{\sqrt{0.67}} = \frac{\hat{\theta} - (-0.5)}{\sigma_{est}}$

зеленовато-коричневая
зеленовато-коричневая
зеленовато-коричневая (зеленая обрешетка)